

1 QU'EST-CE QUE MOMENT 200 gouttes buvables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

COMPOSITION :

Produit actif : ibuprofène 20 g

Exipients : Saccharose, glycérol, méthyl paraben, citrate de sodium, pyridoxine chlorhydrate dédié disosique, saccharine sodique, sulfite de sodium anhydre, polyborate 20, hydroxyde de potassium, arôme de menthe, arôme de citron, arôme de menthe (E172), eau purifiée.

Conservateur : Méthyl paraben

Classe pharmacothérapeutique :

NON STEROÏDIEN (AINS), ANALGÉSIQUE ET ANTI-INFLAMMATOIRE

Indications thérapeutiques :

Ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïden, est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, dans le traitement de douleurs d'origines diverses (tête, épaule, bras, dos, genou, pied, articulations, dentaires, courbatures, névralgies, douleurs ostéo-articulaires, dysménorrhée). Il est également indiqué comme adjvant dans le traitement symptomatique des états fébriles et grippaux.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MOMENT 200 gouttes buvables ?

Contre-indications :

Ne prenez pas MOMENT 200 gouttes buvables dans les cas suivants :
- si vous êtes enceinte ou si vous avez grossesse révolue (24 semaines d'aménorrhée),
- enfant de moins de 12 ans.

- antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'autres médicaments appartenant à la même classe, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (acetylsalicylique, aspirine).

- antécédent d'allergie aux autres constituants de MOMENT 200,
- antécédents d'saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
- ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant, hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,

- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins,
- maladie grave du cœur.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi et recommandations spéciales :

Ibuprofène doit être utilisé avec précaution chez les sujets asthmatiques et particulièrement chez ceux ayant développé un bronchospasme suite à la prise d'acide acetylsalicylique ou d'autres AINS, ainsi que chez les patients avec des antécédents d'asthme ou d'insuffisance respiratoire chronique gastro-intestinaux.

La prise concomitante de MOMENT 200 et d'autres AINS, notamment les inhibiteurs sélectifs de COX-2, doit être évitée.

- Chez les personnes âgées et patients avec un antécédent d'ulcère, en particulier avec une hémorragie ou une perforation, ou d'ulcération, la prise d'acetylsalicylique ou d'autres AINS, notamment les inhibiteurs sélectifs de COX-2, doit être évitée.

Ces patients doivent débuter le traitement avec la plus petite dose efficace. La prise concomitante de certains préparations (misoprostol, corticoïdes) avec la prise de certains AINS doit être évitée.

- Chez les personnes âgées et patients avec un antécédent d'ulcère, en particulier avec une hémorragie ou une perforation, ou d'ulcération, la prise d'acetylsalicylique ou d'autres AINS, notamment les inhibiteurs sélectifs de COX-2, doit être évitée.

- Les patients, notamment les personnes âgées, avec des antécédents de maladie cardiaque (cœur), doivent donc utiliser les AINS avec précaution étant donné que ces événements peuvent être exacerbés. Il doivent rapporter tout symptôme gastro-intestinal inhabituel (sauf un saignement gastro-intestinal, ulcération ou perforation) est accusé avec des doses élevées d'AINS.

Ces patients doivent débuter le traitement avec la plus petite dose efficace. La prise concomitante de certains préparations (misoprostol, corticoïdes) avec la prise de certains AINS doit être évitée.

- Chez les personnes âgées et patients avec un antécédent d'ulcère, en particulier avec une hémorragie ou une perforation, ou d'ulcération, la prise d'acetylsalicylique ou d'autres AINS, notamment les inhibiteurs sélectifs de COX-2, doit être évitée.

- En cas d'ulcération ou de saignement gastro-intestinal pendant l'utilisation de MOMENT, le traitement doit être interrompu.

- Une attention particulière doit être accordée aux patients traités contre l'arthrose, notamment pour éviter d'aggraver le risque d'ulcération ou de saignement tels que les corticoïdes oraux, les agents anti-coagulants comme la warfarine, les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine ou les anti-agrégants plaquettaires comme l'aspirine.

La prise concomitante de MOMENT 200 et d'autres AINS, notamment les inhibiteurs sélectifs de COX-2, peut entraîner un risque léger accroissement de risque cardiaque (c infarctus du myocarde) ou accident vasculaire cérébral ; tout risque est accusé par la prise de fortes doses et de traitements prolongés. Ne pas dépasser les doses et la durée de traitement prescrites par votre médecin.

En cas de maladie du cœur ou d'antécédents d'accident vasculaire cérébral, ou si vous pensez que vous êtes exposés à ce type de pathologies (par exemple en cas d'hypertension ou des niveaux élevés de diabète et de cholestérol dans le sang), parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament contient du méthyl parahydroxybenzoate et peut provoquer des réactions allergiques.

Le médicament contient du sulfite et peut provoquer des réactions allergiques et/ou réactions respiratoires.

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par 50 gouttes.

- Ce médicament contient du saccharose ; son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome du mal du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isoamylase (maladies héritaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments :

Toujours informez votre médecin, dentiste ou pharmacien, si vous prenez un ou plusieurs médicaments dans un délai de moins de 24 heures.

- aspirine (acide acetylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

- corticoïstes

- autres médicaments oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlidpine

- lithium

- méthotrexate

- et d'autre part, de l'enzym de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

- certains antidiabétiques (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

- pénétrexide

- et d'autre part, tacrolimus.

Grossesse et allaitement

Au cours du premier trimestre de grossesse (4 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après la date de l'ultimo jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2 à 5 mois de grossesse (revolue (12 à 24 semaines d'aménorrhée),

Oral route

1 ما هو مومانت 200 قطرات للشرب ومتى هي الحالات التي يستخدم

il utilis?

COMPOSITION :

100 ml de solution contenant :

Produit actif : ibuprofène 20 g
Exipients : saccharose, glycérol, méthyl paraben, sodium citrate, pyridoxine hydrochloride, sodium edetate, sodium saccharine, anhydrous sodium sulfite, polyborate 20, potassium hydroxide, mint flavour, elder flavour, erythrosine (E122), purified water.

Pharmacotherapeutic class :

NON STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUG (NSAID), ANALGESIC AND ANTIPYRETIC.

Indications :

Ibuprofène, qui est un non-stéroïdal anti-inflammatoire drug, est indiqué dans adultes et enfants over 12 years in the treatment of pain of various origins : headache, flu-like symptoms, toothache, muscle aches, backache, menstrual pain, muscular pain, menstrual pain.

It is also indicated as an adjunct in the symptomatic treatment of influenza and febrile states.

Contraindications :

Never use MOMENT 200 oral drops in the following cases: Beyond 5 months of pregnancy (24 weeks gestation), children under 12 years.

History of hypersensitivity triggered by taking this drug or related drugs, including other non-steroidal anti-inflammatory drugs, acetylsalicylic acid (aspirin), ibuprofen.

History of peptic ulcer disease or bleeding ulcers related to previous treatment with NSAIDs.

Evolving or recurrent stomach or intestine ulcer or bleeding peptic ulcer, gastrointestinal bleeding or ulcer.

Serious hepatic deficiency

Serious renal deficiency

Recent heart failure

In CASE OF DOUBT, IT IS ESSENTIAL TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

Precautions for use ; special warnings

Particular care is required in asthmatic subjects and particularly in those who developed bronchospasm following use of acetylsalicylic acid or other NSAIDs and in patients with histories of gastrointestinal bleeding or ulcer.

Caution is advised in patients with history of peptic ulcer disease or bleeding.

Patients in particular the elderly, with history of gastrointestinal diseases (ulcerative colitis, Crohn's disease) should use NSAIDs with caution as they could exacerbate the condition. They should report any unusual abdominal pain, especially if associated with diarrhoea, bleeding or vomiting.

Particular care is required in patients with history of hypertension, diabetes mellitus, arterial and especially cerebral, and especially if associated with smoking.

When gastrointestinal bleeding or ulceration occur in patients using NSAIDs, the treatment should be aimed at reducing the risk of ulceration or bleeding, such as oral corticosteroids, anticoagulant agents like warfarin, selective inhibitors of serotonin reuptake or antiplatelet drugs.

Medications such as MOMENT can be associated to a slightly increased risk of heart attack (= myocardial infarction) or stroke. Any risk is increased by high doses and prolonged treatments. Do not exceed the recommended dose.

In case of heart disorders or history of stroke, or you think you are at risk for those pathologies (due, for instance, to high blood pressure or high levels of diabetes and cholesterol, or smoking), your therapy should be discussed with the doctor or pharmacist.

This drug contains methyl parahydroxybenzoate and may induce allergic reactions.

This drug contains sulfite and may induce severe allergic reactions and diuretic effects.

This drug contains small amounts of ethanol (alcohol), less than 100 mg per 50 drops.

This drug contains sucrose; its use is unadvised in case of intolerance to fructose, lactose, glucose or galactose malabsorption, or a deficit in sucrase/isoamylase (hereditary diseases).

Drugs interactions

Always inform your doctor, dentist or pharmacist if you take any of these drugs in addition to MOMENT 200 oral drops:

- acetylsalicylic acid) or other anti-inflammatory drugs

- corticosteroids

- oral anticoagulants such as warfarin, heparin injection, antiplatelet or other thrombotic agents such as ticlidpine

- methotrexate

- inhibitors of the angiotensin converting enzyme, diuretics, beta-blockers and angiotensin II antagonists

- certain antidepressants (selective inhibitors of serotonin reuptake) (SSRIs)

- penicillin

- cyclosporin, tacrolimus.

Pregnancy and breastfeeding

During the first trimester of pregnancy (12 weeks amenorrhoea or if necessary to confirm the pregnancy), do not take this drug if you are 5 months or more pregnant (from 12 to 24 weeks amenorrhoea),

this drug will be used only on the advice of your doctor and briefly. Prolonged use of this medication is strongly advised.

Beyond 5 months of pregnancy (beyond 24 weeks of amenorrhoea), you may have serious consequences especially on your child may have serious consequences especially on your child's cardio-pulmonary and kidney systems, even with a single dose.

You take the medicine while you are pregnant for more than five months, please talk to your obstetrician gynaecologist so that an monitoring monitoring may be proposed to you.

Lactation

This medication passes into breast milk. As a precaution, you should avoid using it while breastfeeding.

ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE TAKING ANY MEDICATION.

ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en très courte. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillé. Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'hémorragie), vous ne devrez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur son développement cérébral et visuel. Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

Attention : Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRÉNOMMER CE MÉDICAMENT.

Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

Liste des excipients à effet notable : Saccharose, méthyl paraben, sulfite de sodium.

3 COMMENT PRENDRE MOMENT 200 gouttes buvables ?

La prise de ce médicament peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Posologie :

ADULTE ET ENFANT À PARTIR DE 12 ANS.

1 ml soit 20 gouttes = 200 mg d'ibuprofène.

25 à 50 gouttes, 2 à 3 fois par jour.

Ne jamais dépasser la dose de 50 gouttes, 3 fois par jour (1200 mg).

Mode et voie d'administration :

Oral, par voie buccale.

Les gouttes sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

Fréquence d'administration :

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre. Les intervalles doivent être suffisants.

Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Durée du traitement :

Après 3 à 5 jours d'efficacité, sans résultat apaisant suffisant, contactez votre médecin.

Si vous avez pris plus de MOMENT 200 gouttes buvables que vous n'aurez dû : ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

Si vous oubliez de prendre MOMENT 200 gouttes buvables :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublie de prendre.

4 QUELS SONT LES ÉVENTUELS EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, MOMENT 200 gouttes buvables est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit sujet. Il pourra augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral.

Pour prévenir des réactions allergiques :

- cutanées (éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique)

- respiratoires, de type crise d'asthme

- généralement, brusque gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke).

Dans certains cas, il est possible que survienne une hémorragie gastro-intestinale. Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des marques de tâche accompagnées de nausées, de vomissements et de raidissement de la cuisse.

Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure accompagnée de rougeur avec bulles ou érosions).

Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent :

- des troubles digestifs: mal à l'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation,

- céphalées, vertiges, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des unités insuffisance rénale.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique (augmentation de la baisse des globules blancs ou des globules rouges) pouvant être graves.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 Comment conserver MOMENT 200 gouttes buvables ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption :

Ne pas prendre ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation :

Conserver à température ambiante ne dépassant pas +25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez pas l'étiquette sur tout l'étiquetage ou avec les ordres ménagers.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6 Informations supplémentaires

Tableau C / Liste II.

Titulaire d'A.M.M.: OPALIA PHARMA S.A (RECORDATI GROUP)

Opalia Pharma S.A. Saléah El Andalous 2022 Ariana, Tunisie

www.opaliapharma.com.tn

AMM N°: 902 364 1 - MOMENT 200, 200 mg/ml, gouttes buvables flacon de 12,5 ml.

Date de révision de la notice : Juillet 2017

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à danger.

- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi pour lequel il vous prescrit.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses indications et ses contre-indications.

- Ne le prenez pas par votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

انه مسكن للآلام يساعد على تخفيف الآلام والتهابات المفاصل

يستخدم هذا الدواء غير موصى به لفترة وجيزة، إلا في الحالات الطارئة.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

الإكثار من تناول هذا الدواء يزيد من خطر حدوث اضطرابات في الأمعاء.

Effects on the ability to drive and using machines

In rare cases, taking this medicine may cause dizziness and blurred vision. List of excipients with known effects: sucrose, methyl paraben and sodium sulfate.

3 HOW TO MOMENT200, gouttes buvables ?

The undesirable effects can be reduced to their minimum where the minimal effective dose is used for the shortest term of treatment necessary to control the symptoms.

Dosage: ADULT AND CHILD OVER 12 YEARS OF AGE.

1ml= 25 drops = 200 mg of ibuprofen.

20 to 35 drops, 2 or 3 times daily.

No more than 60 drops 3 times daily (1200 mg).

Mode et route de administration :

Oral route.

The drops are to be taken, preferably with meals.

Systematic intakes help to avoid oscillations of pain or fever.

They must be spaced by 6 hours at least.

Expiration date:

If after the expiration date, the obtained results are not significant, contact your doctor.

Symptoms and instructions in case of overdose or omission

If you have taken more MOMENT 200 oral drops than you should: TAKE THE REMAINING DROPS AND CONTACT YOUR DOCTOR.

If you forget to take MOMENT 200 oral drops :

DO NOT take a double dose to make the single dose you have missed.

4 WHAT ARE THE POTENTIAL SIDE EFFECTS ?

As any medicine, MOMENT 200, oral drops is likely to induce side effects, although everybody do not get them.

It may increase the risk of heart attack (myocardial infarction) or stroke.

May occur allergic reactions:

- urticaria, rash, itching, swelling, worsening of chronic respiratory, type asthma crisis, generalized; sudden swelling of the face and neck with difficulty breathing.

In rare cases, may occur a gastrointestinal hemorrhage. This is even more common than the dose used is high.

It may exceptionally be observed headaches accompanied by nausea, vomiting and/or diarrhea.

exceptionally, may occur events of bullous skin or mucosa (burning sensation with redness with bubbles, blisters, ulcerations). Exceptionally, severe infections of the skin were observed in case of chickenpox.

In these cases, you must immediately stop treatment and tell your doctor.

During treatment, it is possible that:

- digestive disorders: abdominal pain, vomiting, nausea, diarrhea, constipation;

- exceptionally, dizziness, headache, rare eye disorders, significant decrease in urine, kidney failure.

In all these cases, you must tell your doctor.

If any side effects change, may be observed in the liver or blood count (decrease in white blood cells or red blood cells) that can be serious.

If you notice any side effects not listed in this leaflet, or if the side effects gets serious, please tell your doctor or pharmacist.

5 How to store MOMENT 200 oral drops?

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Expiration date:

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the box.

The expiry date refers to the last day of which month.

Do not store above +25°C.

If necessary, warnings against visible signs of deterioration

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you longer use. These measures will help protect the environment.

6 Further information

Table C / Liste II.

M.A. Holders OPALIA PHARMA S.A (RECORDATI GROUP)

Industrial Zone of Kalatah El Andalous 2022 Ariana, Tunisia

www.opaliapharma.com.tn

M.A. N°: 902 364 1 - MOMENT 200, 200 mg/ml, oral drops, bottle 12,5 ml.

La date de révision de la notice: July 2017.

7 Toute question ou tout problème, contacter le fabricant

Chapitre 11: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 12: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 13: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 14: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 15: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 16: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 17: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 18: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 19: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 20: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 21: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 22: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 23: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 24: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 25: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 26: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 27: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 28: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 29: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 30: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 31: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 32: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 33: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 34: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 35: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 36: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 37: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 38: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 39: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 40: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 41: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 42: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 43: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 44: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 45: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 46: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 47: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 48: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 49: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 50: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 51: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 52: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 53: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 54: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 55: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 56: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 57: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 58: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 59: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 60: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 61: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 62: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 63: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 64: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 65: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 66: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 67: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 68: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 69: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 70: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 71: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 72: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 73: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 74: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 75: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 76: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 77: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre 78: انتشار المرضية | انتشار المرضية | انتشار المرضية

Chapitre