

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être, un traitement plus approprié doit être initié.

- Ne prenez pas DIAMIZED si vous allaitez.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Votre capacité de concentration ou de réaction peut être diminuée en cas d'hypoglycémie, ou d'hypertension, ou si vous développez des problèmes de vision en conséquence. Sachez que vous pouvez mettre votre vie et celle des autres en danger (par exemple lors de la conduite d'un véhicule ou de l'utilisation de machines).

- Demandez à votre médecin si vous pouvez conduire un véhicule.
- En cas d'épisodes fréquents d'hypoglycémie.
- Si vous avez peu ou pas de signes d'avertissement d'hypoglycémie.

COMMENT PRENDRE DIAMIZED?

Posologie
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie est déterminée par votre médecin, en fonction de votre glycémie et éventuellement de votre taux de sucre dans les urines.
Des changements de facteurs externes (par exemple perte de poids, changement de votre style de vie, stress) ou une amélioration du contrôle de votre glycémie pourraient nécessiter un changement de la posologie.
DIAMIZED 30 mg comprimé pelliculé à libération modifiée:
La dose recommandée est de 1 à 4 comprimés (maximum 120 mg) en une seule prise, à petit déjeuner. Cela dépend de la réponse au traitement.

DIAMIZED 60 mg comprimé pelliculé sécable à libération modifiée:
La dose recommandée est de 1/2 à 2 comprimés (maximum 120 mg) en une seule prise, à petit déjeuner ou au déjeuner, avec ou sans nourriture.
Si une association du traitement par DIAMIZED avec de la metformine, un inhibiteur de l'alpha-glucosidase, une thiazolidinone, un inhibiteur de la dipeptidyl peptidase 4, un agoniste des récepteurs du GLP-1 ou l'insuline est initiée, votre médecin déterminera selon votre cas la dose appropriée de chaque médicament. Si vous remarquez que votre taux de glycémie est élevé bien que vous preniez le médicament conformément à la prescription, vous devez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Mode et voie d'administration

Voie orale
Le ½ comprimé ou le(s) comprimé(s) doivent être avalés en une seule fois. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ni écrasés.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau au petit déjeuner (et de préférence chaque jour à la même heure).
La prise de vos comprimés doit toujours être suivie d'un repas.
Symptômes et instructions en cas de surdosage
Si vous avez pris plus de DIAMIZED que vous n'auriez dû:
Contactez immédiatement votre médecin ou les urgences de l'hôpital le plus proche.

La prise d'une dose excessive se traduit par une hypoglycémie. Celle-ci doit être traitée immédiatement par l'administration de sucre (à 6 morceaux) ou d'une boisson sucrée, et suivi d'un en-cas ou d'un repas substantiel.
Si le patient est inconscient, avertit immédiatement un médecin et prévenir les secours d'urgence.

Même précautions doivent être prises si quelque'un, par exemple un enfant, a pris le médicament involontairement. Il ne faut pas donner de la nourriture ou une boisson à un patient inconscient.
Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses
Si vous oubliez de prendre DIAMIZED, il est important de prendre votre médicament chaque jour de manière régulière pour que le traitement reste efficace.
Cependant, si vous oubliez de prendre DIAMIZED le jour suivant reprenez votre traitement comme d'habitude. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose manquante que vous avez oubliée de prendre.
Risque de syndrome de sevrage
Si vous arrêtez de prendre DIAMIZED, il peut se produire un syndrome de sevrage. En cas de diabète étant généralement un traitement au long cours, vous devez demander conseil à votre médecin avant de l'interrompre. L'arrêt du traitement peut entraîner une hypoglycémie.
En cas d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DIAMIZED est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
L'effet secondaire le plus commun observé est l'hypoglycémie. Si ces symptômes ne sont pas traités, ils peuvent évoluer en somnolence, perte de conscience voire coma.
En cas d'hypoglycémie sévère ou prolongée, métemporairement contrôlée par une absorption de sucre, vous devez contacter immédiatement un médecin.

Troubles du foie

Des cas isolés de fonction hépatique anormale, pouvant entraîner une coloration jaune des yeux et de la peau, ont été rapportés. Si vous avez ces symptômes, contactez immédiatement votre médecin. Les symptômes disparaissent généralement à l'arrêt du traitement. Votre médecin décidera si vous devez arrêter votre traitement.

Troubles de la peau

Des cas de réactions cutanées tels que rash, rougeurs, démangeaisons et urticaire ont été rapportés.
Des réactions cutanées sévères peuvent aussi apparaître.

Troubles sanguins

La diminution du nombre de cellules dans le sang (par exemple plaquettes, globules blancs et rouges) peut causer une pâleur, des saignements prolongés, des contusions, un mal de gorge et de la fièvre. Ces symptômes disparaissent généralement à l'arrêt du traitement.

Troubles digestifs

Douleurs abdominales, nausées, vomissements, indigestion, diarrhée et constipation. Ces effets peuvent être réduits quand DIAMIZED est pris avec un repas, comme recommandé.

Troubles de la vision

Votre vision peut être affectée pendant un court moment en particulier lors de l'instauration du traitement. Cet effet est dû aux variations de la glycémie. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DIAMIZED?

Ne pas utiliser DIAMIZED après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRE

Niveau A / Liste I

Site web : www.opalipharma.com.tn
Titulaire de l'A.M.M. OPALIA PHARMA (RECORDATI GROUP) Zone Industrielle Kalaat El Ahdaf, 4022 Ariana - TUNISIE
A.M.M. N°: 902 391 1 DIAMIZED 30 mg comprimé pelliculé à libération modifiée, boîte de 30.
A.M.M. N°: 902 391 2 DIAMIZED 60 mg comprimé pelliculé sécable à libération modifiée, boîte de 30.
A.M.M. N°: 902 391 4 DIAMIZED 60 mg comprimé pelliculé sécable à libération modifiée, boîte de 90.
Date de révision de la notice : Février 2021

يوجد إيداع الطبيب أيا ما كنت حاملا أو في حال ارتفعتك في الحمل، يرجى وضع علاج خاص باللكم.

لا تستعملی دياميزيد أثناء فترة الرضاعة.
قيادته والعمليات والنهض على الآلات:
قد تقلدك على التركيز ورد الفعل يمكن أن يتأثر إذا ليخضعك نسبة السكر في الدم أو إذا ارتفعت جدا، ما سيؤثر على استعمالك في الرؤيعة. أي كنت تعرض جيلتك أو حياة الآخرين للإصابة عند قيادته والعمليات أو استعمال الآلات.

- يجب استشارة الطبيب عند قيادته السيارة.
- في حال ورود نوبات متكررة لنقص السكر في الدم.
- إذا كانت إشارات نقص السكر في الدم قليلة أو منعدمة.

3. كيف يستعمل دياميزيد؟

المقادير:
في جميع الحالات يجب التقيد تماما بوصفة الطبيب أو الصيدليك راجع طبيبك أو الصيدليك في حال شك.

الطبيب المعالج هو الذي يحدد الجرعة التي يجب تناولها والتي تتوقف على حسب نسبة السكر في الدم وربما نسبة السكر في البول.
أيا تقريدها، حاول المراقبة على فترات اذن، تفكير دمع طبيك الصمغ (نفسيا) أو تحسن مراقبة نسبة السكر في الدم عند تناول تفكير في عدد الحرات.

دياميزيد 30 قرص مغلف ذو تحرير معدل
الجرعة اليومية المعتادة هي من 1 إلى 4 أقراص (الحد الأقصى من 120 ملجم) لمرجة واحدة، عند الإفطار، وهاذ راجع للتجاوب مع الدواء.

دياميزيد 60 قرص مغلف قابل للإلتصاق ذو تحرير معدل
الجرعة اليومية المعتادة هي من 1 إلى 2 أقراص (الحد الأقصى من 120 ملجم) لمرجة واحدة. عند الإفطار، وهاذ راجع للتجاوب مع الدواء.
أي ما جمع بين العلاج بدياميزيد و المتفورمين، المقدمات ألفا الفلوكوريزيداز أو أم الأوسولين، طبيبك هو الذي يحدد الجرعة المناسبة حسب حالتك، لكل دواء.

أي لاحظت ارتفاع نسبة السكر في الدم، رغم تفقيك للباوصفة والجرعات المحددة لا بد من مراجعة الطبيب المعالج.

كيفية وطرق الاستعمال:

تبع الأقراص منشطرة أو كاملة ووردة واحدة. لا ينبغي مضغها. يجب تناول الأقراص مع كأس ماء عند الإفطار أو يفضل أن يكون كل يوم في نفس الساعة.
كل مرجة يجب أن تتهاججية أكًا.
الطرائف والملاحظات في حال الأقراص في الجرعة
أي ما جمع بين ديتانولام، دياميزيد، قرص مغلف أكثر مفعول. أي ما جمع بين إيثا فورا، مينيك أو هادو مركز فوراني، طبيك هو الذي يحدد الجرعة المناسبة حسب حالتك، لكل دواء.
أي لاحظت ارتفاع نسبة السكر في الدم، رغم تفقيك للباوصفة والجرعات المحددة لا بد من مراجعة الطبيب المعالج.

أخرى للطبيب و أطفيوا الأقراص.
يجب أخذ نفس الاحتياطات أيما تناول شخصي أو مع الشروري يكون ومن وجود شخصي على إبطاء أو طعام أو مشروب أو فلفد لونه من الشروري يكون ومن وجود شخصي على إبطاء أو غيره استنداع الطبيب في حالة الطوارئ.

تعليمات في حال نسيان جرعة أو أكثر
لا يتمسك تناول دياميزيد.

من المهم تناول دواؤكم بوضوء بصفة منتظمة حتى يغمش العلاج بشكل فعال.
أيما لا تتناول جرعة اليوم أو إرتال دياميزيد تتناول في اليوم التالي بصفة عادية. لا تتناول جرعة إيا ما جمع بين ديتانولام، دياميزيد، قرص مغلف أكثر مفعول.

أعراض التوقف عن العلاج:

أيما إيقاف عن استعمال دياميزيد.
أعلام عا السكرية عادة يكون لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب قبل التوقف عن العلاج.
التوقف عن العلاج يفؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.
في حالة النقص من السكرية شديدة أو مفترات نسبة السكرية في حالة التوقف عن استعمال هذا الدواء، لا تتردد في الإستفسار من طبيبك أو الصيدليك.

4. ماهي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة ؟

مثل أي دواء، قد يسبب دياميزيد لدى بعض الأشخاص تأثيرات مزعجة ؛
التأثيرات الجانبيه الأكثر شيوعا هو انخفاض لنسبة السكر في الدم. أيما لا تتعالج هذه الأعراض، يمكن أن تتطور إلى نقصان الإغذاء وحتى القيظوية.
في حالة انخفاض شديد أو مفترات نسبة السكرية في الدم، حتى لو كانت مرادة لفترة مؤقتة ينتهال الطبيب، يجب استشارة الطبيب فوراً.

إضرابات في الكبد:

بعض حالات متعلقة من هذه الأعراض هي وظائف الكبد، يمكن أن تسبب إفسار في العينين والجلد. أيما كانت تعاني من هذه الأعراض، راجع لطبيبك فوراً. تزول الأعراض عادة بعد التوقف عن العلاج.

طبيبك سوف يقرر متى يجب التوقف عن العلاج.

إضرابات جلدية:

تم الإبلاغ عن بعض الحالات كطفح جلدي، احمرار، حكةً وشرى.
قد يحدث أيضاً رد فعل تحسسي جلدي حاد.

إضرابات الدم:

انخفاض عدد خلايا الدم (تخلخل الدم)
شجوب، قلة إفرازة طوييلة، كدمات، التهاب الحنجرة وارتفاع الحرارة. تزول هذه الأعراض عادة بعد التوقف عن العلاج.

إضرابات في الجهاز الهضمي:

آلم في البطن، غثيان، غيب، سوء الهضم، إسهال وإمساك.
دياميزيد مادة خافضة.
إضرابات في الرؤيعة:
أيما تنازل الرؤيعة تترك نسبة السكر في الدم منخفضة.
لتغيرات لسية السكرية في الرؤيعة.
لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي و إلا مهماها بأي تأثير غير مرغوب فيه و مزعج لم يرد ذكره في هذه النشرة.

5. كيف يحفظ دياميزيد؟

لا يستعمل دياميزيد بعد تاريخ انتهاء الصلاحيه المذكورة على العبوة.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

جدول A / قائمة I
www.opalipharma.com.tn
موقع المؤسسة: أوباليا فورما أجمع ويكتوراوتي المنطقة الصناعية قنعة الأندلس - 2022
أريانة، تونس
تاسيرة رقم: 902 391 1 دياميزيد 30 قرص مغلف ذو تحرير معدل
ذات قرص.
تاسيرة رقم: 902 391 2 دياميزيد 60 قرص مغلف قابل للإلتصاق ذو تحرير معدل
على ذات قرص.
تاسيرة رقم: 902 391 4 دياميزيد 60 قرص مغلف قابل للإلتصاق ذو تحرير معدل
على ذات قرص.
تاريخ مراجعة النشرة: فيفري 2021

إن هذا دواء

- الدواء مستحض و لكنه ليس كغيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات
يعرض للحظر.
- ايض بقفة وصفه الطبيب و طريقة الاستعمال التي حددها لك.
- اقتنى بصلاصه الصيدلي الذي صرفها لك.
- فالحليب و الصمدي هوما الخبير بالذاء و وبقعه و ضرره.
- لا تتقلع عن تلقاء نفسك الاماواة خلال االزمنة المحددة لذلك.
- لا تعد لي الدماوات ولا تزود تلقا عليها بوان إستمشارة الطبيب.

لا تتراك الأدوية أيدا في متناول أيدي الأطفال

3. HOW TO USE DIAMIZED?

Posology
Always follow the exact dosage prescribed by your doctor or pharmacist. The dose is determined by your doctor or your pharmacist, depending on your blood sugar and possibly your blood sugar in the urine. Changes in external factors (eg weight loss, change in lifestyle, stress) or better control of your blood sugar may need a change in dosage.
DIAMIZED 30 mg modified release film-coated tablet:
The usual dose is 1 to 4 tablets (maximum 120 mg) in a single dose at breakfast time.

DIAMIZED 60 mg modified release film-coated scored tablet:
The usual dose is 1/2 to 2 tablets (maximum 120 mg) in a single dose at breakfast. It depends on the response to treatment.

If a combination therapy with metformin, an inhibitor of alpha-glucosidase and insulin is established, your doctor will decide according to your case the appropriate dose of each drug.

Method and route of administration:
Oral
The 1/2 tablet or tablet (s) should be swallowed at once. The tablets should not be chewed or crushed.
The tablets should be swallowed with a glass of water at breakfast (and preferably every day at the same time).
Taking your tablets should always be followed by a meal.
Symptoms and instructions in case of overdose:
If you have used more DIAMIZED than you should:
Contact your doctor or emergency of the nearest hospital.
Taking an overdose leads to hypoglycaemia. This must be treated immediately by the administration of sugar (4 to 6 pieces) or a sweet drink, and followed by a snack or a substantial meal.

The patient is unconscious, immediately notify a physician and prevent emergency.
The same precautions must be taken if someone, such as a child, took the drug unknowingly. Do not eat food or drink to an unconscious patient.
Instructions for failure of one or more doses
If you miss DIAMIZED:
It is important to take your medicine every day on a regular basis so that treatment works better.
However, if you miss DIAMIZED next day go back to your usual dose. Do not take a double dose to make simple dose you missed.
Risk of withdrawal syndrome
If you stop taking DIAMIZED:
It is important to usually a long-term treatment, you should consult your doctor before stopping. Stopping treatment may lead to hypoglycaemia.

If you have questions about using this medicine, ask your doctor or pharmacist.
4. WHAT ARE THE POTENTIAL SIDE EFFECTS?
Like all medicines, DIAMIZED may cause side effects, although very often not serious. The side effect most commonly observed is hypoglycaemia. If these symptoms are not treated they can develop into drowsiness, unconsciousness or coma.
If severe or prolonged hypoglycaemia, even temporarily controlled by the absorption of sugar, you should contact a doctor immediately.
Liver disorders
Isolated cases of abnormal liver function, which can cause yellowing of the eyes and skin have been reported. If you have these symptoms, see your doctor immediately. The symptoms usually disappear after discontinuation of treatment.

Isolated cases of abnormal liver function, which can cause yellowing of the eyes and skin have been reported. If you have these symptoms, see your doctor immediately. The symptoms usually disappear after discontinuation of treatment.
Skin disorders
Cases of skin reactions such as rash, redness, itching and urticaria have been reported.
Severe skin reactions may also occur.
Blood disorders
The decrease in the number of cells in the blood (eg platelets, red and white) can cause pallor, prolonged bleeding, bruising, sore throat and fever. These symptoms usually disappear after discontinuation of treatment.
Digestive disorders
Abdominal pain, nausea, vomiting, indigestion, diarrhoea and constipation. These effects can be reduced when DIAMIZED is taken with a meal, as recommended.
Vision disorders
Your vision may be affected for a short time especially when starting treatment. This effect is due to changes in blood sugar. If you notice any side effects not listed in this leaflet, or if the side effects become severe, tell your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE DIAMIZED?

Do not use DIAMIZED after the expiry date indicated on the outer packaging. Do not store above 25°C.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRE

Niveau A / Liste I
Site web : www.opalipharma.com.tn
Titulaire de l'A.M.M. OPALIA PHARMA (RECORDATI GROUP) Zone Industrielle Kalaat El Ahdaf, 4022 Ariana - TUNISIE
A.M.M. N°: 902 391 1 DIAMIZED 30 mg modified-release film-coated tablet, box of 30.
A.M.M. N°: 902 391 2 DIAMIZED 60 mg modified-release film-coated scored tablet, box of 30.
A.M.M. N°: 902 391 4 DIAMIZED 60 mg modified-release film-coated scored tablet, box of 90.
Date de révision de la notice : February 2021

AC1703/V1

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interrupt by your self the period of treatment prescribed for you.
- Neither report the prescription nor increase the dose without consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants