AC0595/V6

Diclopal®

100 mg

Diclofénac sodique
Suppositoires

1 QU'EST-CE QUE DICLOPAL 100 mg, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Composition
Substance active :
Diclofénac sodique .... 100 mg
Pour un suppositoire.
Excipients :
Glycérides semi-synthétiques liquides, glycérides semi-synthétiques solides, poudre de cellulose.
Forme pharmaceutique et contenu
Ce médicament se présente sous forme de suppositoires. Boîte de 10.
Classe pharmacothérapeutique
ANTI-INFLAMMATOIRES, ANTIRHUMATISMAUX, NON STEROIDIENS
Indications thérapeutiques
Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le diclofénac. Il est indiqué dans :
- le traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes,
- le traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes articulaires et des arthroses.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DICLOPAL 100 mg, suppositoire ?

Contre-indications
N'utilisez jamais DICLOPAL 100 mg, suppositoire :
–au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
–en cas d'antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
–si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (diclofénac) ou à l'un des autres composants de DICLOPAL 100 mg, suppositoire, mentionnés dans la rubrique 6,
–en cas d'antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
–en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
–en cas d'hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
–en cas de maladie grave du foie,
–en cas de maladie grave du rein,
–en cas de maladie cardiaque et/ou de maladie vasculaire cérébrale avérée, par exemple si vous avez été victime d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral (AVC), d'un accident ischémique transitoire (AIT) ou d'une obstruction des vaisseaux sanguins irriguant le cœur ou le cerveau ou si vous avez été opéré pour éliminer ou court-circuiter cette obstruction,
–en cas d'antécédents de troubles de la circulation sanguine ou de troubles actifs (artériopathie périphérique),
–en cas d'inflammations ou saignements récents du rectum (contre-indication liée à la voie d'administration),
–chez l'enfant de moins de 15 ans.
Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales
Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DICLOPAL 100 mg, suppositoire.
Les médicaments tels que DICLOPAL 100 mg, suppositoire, pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.
Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
Si vous êtes une femme, DICLOPAL 100 mg, suppositoire, peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des difficultés pour procréer ou chez lesquelles des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser DICLOPAL 100 mg, suppositoire.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
Avant que votre médecin ne vous prescrive DICLOPAL 100 mg, suppositoire, assurez-vous qu'il sait, le cas échéant :
–Que vous fumez.
–Que vous êtes diabétique.
–Que vous avez une angine de poitrine, des caillots sanguins, une pression artérielle élevée, un cholestérol élevé ou des triglycérides élevés.
–Que vous avez des antécédents d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais DICLOPAL 100 mg, suppositoire »).
–Que vous avez des troubles de la coagulation, ou que vous prenez un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves.
–Que vous avez des antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens), de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn.
–Que vous êtes atteint de maladie, du foie ou du rein.
Dans ces cas, il pourrait être nécessaire d'adapter votre traitement.
AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS :
–d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.
–de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou accompagnés ou non de difficultés respiratoires notamment à l'effort, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.
–d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.
Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte nécessaire.
Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le diclofénac.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).
Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'acide acétylsalicylique (aspirine).
Ce médicament existe sous forme d'autres dosages qui peuvent être plus adaptés.
Interactions avec d'autres médicaments
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.
Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre DICLOPAL 100 mg, suppositoire :
–aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens
–corticostéroïdes
–anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlopidine
–lithium
–méthotrexate
–inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II
–certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)
–pémétrexed
–ciclosporine, tacrolimus
–déférasirox, bêta-bloquants.
Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement
Grossesse
1) Jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolu), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament de façon ponctuelle.
2) A partir de la 25éme semaine d'aménorrhée (début du 6éme mois de grossesse), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardiopulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Allaitement
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges, une somnolence, des troubles de la vue.

3 COMMENT UTILISER DICLOPAL 100 mg, suppositoire ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement
Posologie
· **ADULTE :** La posologie dépend de l'indication.
·**Rhumatologie :**
–Traitement d'attaque : 150 mg en 2 prises, soit 1 suppositoire à 100 mg, à compléter avec une forme orale.
–Traitement d'entretien : 1 suppositoire à 100 mg par jour, le soir au coucher.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.
Mode et voie d'administration
Voie rectale.
Durée du traitement
L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité locale surajoutée aux risques de la voie orale.
Symptômes et instructions en cas de surdosage
Si vous avez utilisé plus de DICLOPAL 100 mg, suppositoire que vous n'auriez dû :
En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, PREVENIR IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.
Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses
Si vous oubliez d'utiliser DICLOPAL 100 mg, suppositoire :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Les médicaments tels que DICLOPAL 100 mg, suppositoire pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.
Peuvent survenir :
•des réactions allergiques :
– cutanées : éruption, urticaire, eczéma,
– respiratoires : crise d'asthme, affection du poumon,
–générales, notamment chez les sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique,
–autres : inflammation des petits vaisseaux sanguins, hypotension.
•peu fréquemment (en particulier lors d'un traitement prolongé et à forte dose [150 mg]), une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque (caractérisée par un essoufflement, une difficulté à respirer lorsque vous êtes allongé, un gonflement des jambes ou des pieds).
•très rarement, un décollement de la peau avec formation de bulles pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps, une réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux U.V., des petites taches violettes sous la peau (purpura), un accident vasculaire cérébral.
•rarement, une hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.
•rarement, une jaunisse.
Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.
Au cours du traitement, il est possible que surviennent également :
•des troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, crampes abdominales, maux d'estomac, digestion difficile, perte d'appétit, rots, inflammation de l'estomac ou de l'intestin, irritation ou inflammation de l'anus ou du rectum (effets liés à la voie d'administration), rechute de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn,
•des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, une somnolence, des convulsions, une insomnie, une nervosité, une fatigue, des tremblements, des fourmillements, des troubles de la vue, des bourdonnements d'oreille,
•une chute des cheveux,
•des troubles du fonctionnement des reins, de rares œdèmes,
•des troubles du fonctionnement du foie.
•une augmentation de la tension (hypertension artérielle).
Dans tous les cas, avertir votre médecin.
•Des cas d'ulcère ou de perforation gastro-intestinale, d'inflammation du pancréas, d'hépatites sévères (inflammation du foie), de méningite ont été rapportés.
•Ont été également observées des anomalies de la formule sanguine, des bilans hépatique et rénal, pouvant être graves.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5 COMMENT CONSERVER DICLOPAL 100 mg, suppositoire ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Date de péremption
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.
Conditions de conservation
Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Tableau C / Liste II
Titulaire de l'A.M.M : OPALIA PHARMA S.A. (RECORDATI GROUP), Zone industrielle Kalaat El Andalous 2022 Ariana Tunisie
Site web : www.opaliapharma.com.tn
A.M.M. N° : 902 343 1 ; DICLOPAL 100 mg, suppositoire, boite de 10.
Date d'approbation de la notice : Mai 2017

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre intiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

Diclopal®

Diclofenac sodium

Suppositories

100 mg

1 WHAT IS DICLOPAL 100 mg suppository AND IN WHICH CASES IS IT USED?

Composition

Active substance:

Diclofenac sodium..... 100 mg

For one suppository.

Excipients:

Liquid semi-synthetic glycerides, solid semi-synthetic glycerides, cellulose powder.

Pharmaceutical form and content

This drug is in the form of suppositories. Box of 10.

Pharmacotherapeutic group

ANTIINFLAMMATORY, ANTIRHEUMATIC, NOT STEROIDAL

Therapeutic indications

This medicine contains a non-steroidal anti-inflammatory drug: diclofenac. It is indicated in:

- long-term symptomatic treatment of chronic inflammatory rheumatism and some painful and disabling arthrosis,
- short-term symptomatic treatment of articular rheumatism and arthrosis.

2 WHAT INFORMATION TO KNOW BEFORE USING DICLOPAL 100 mg suppository?

Contra-indications

Never use DICLOPAL 100 mg suppository:

–beyond 5 months of pregnancy (24 weeks gestation)

–in case of allergy or history of asthma triggered by taking this medicine or a related drug, including other non-steroidal anti-inflammatory drugs, acetylsalicylic acid (aspirin)

–if you are allergic (hypersensitive) to the active substance (diclofenac) or one of the other components of DICLOPAL 100 mg suppository, mentioned in section 6,

–in case of a history of gastrointestinal bleeding or ulcers associated with previous treatment with NSAIDs,

–in case of ulcer of the stomach or duodenum former evolving or recurrent

–in case of gastrointestinal bleeding, cerebral hemorrhage or other bleeding ongoing

–in case of severe liver disease,

–in case of severe kidney disease,

–in case of cardiac disease and / or cerebro-vascular disease proved, for example if you have suffered a heart attack, stroke, transient ischemic attack (TIA) or obstruction of blood vessels supplying the heart or brain or if you have had surgery to remove or bypass the obstruction,

–if history of impaired blood flow or active disorders (peripheral arterial disease),

–in case of inflammation or recent rectal bleeding (contra-indication related to the route of administration)

–in children under 15 years.

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking DICLOPAL 100 mg suppository.

Medications such as DICLOPAL 100 mg suppository could increase the risk of heart attack (myocardial infarction) or stroke. The risk is even more important that the doses used are high and the treatment is prolonged.

Do not exceed the recommended dose or duration of treatment.

If you are a woman, DICLOPAL 100 mg suppository, may impair fertility. Its use is not recommended in women who wish to conceive. In women who have difficulties to procreate or in which examinations on reproductive function are underway, please talk to your doctor or pharmacist before using DICLOPAL 100 mg suppository.

The elderly have a higher risk of adverse effects, particularly gastrointestinal bleeding, ulcers and perforations. Renal, hepatic and cardiac function should be closely monitored. The dosage should be as low as possible for the shortest duration necessary to control symptoms.

Before your doctor prescribes you DICLOPAL 100 mg suppository, make sure he knows, if applicable:

–whether you smoke.

–whether you are diabetic.

–whether you have angina, blood clots, high blood pressure, high cholesterol or high triglycerides.

–whether you have a history of asthma associated with chronic rhinitis, chronic sinusitis or nasal polyps. The administration of this specialty can cause an asthma attack, especially in certain subjects allergic to acetylsalicylic acid (aspirin) or a non-steroidal anti-inflammatory drug (see section "Do not take DICLOPAL 100 mg Suppository").

– whether you have bleeding disorders, or are taking anticoagulant therapy. This drug can cause serious gastrointestinal events.

–Whether you have digestive history (hiatal hernia, gastrointestinal bleeding, ulcers of the stomach or duodenum old), ulcerative colitis or Crohn's disease.

–Whether you are suffering from a liver or kidney disease.

In these cases, it may be necessary to adjust your treatment.

DURING TREATMENT IF YOU HAVE:

–gastrointestinal bleeding (discharge of blood from the mouth, blood in the stool or black stool color), STOP TREATING AND CONTACT A DOCTOR OR A MEDICAL EMERGENCY SERVICE IMMEDIATELY.

–suggestive signs of allergy to the drug, including asthma attack or sudden swelling of the face and neck with or without respiratory problems including stress, STOP TREATMENT AND CONTACT A DOCTOR OR A MEDICAL EMERGENCY SERVICE IMMEDIATELY.

–appearances of cutaneous or mucosal signs that look like burns (redness with bubbles or blisters, ulcers), STOP TREATING AND CONTACT A DOCTOR OR A MEDICAL EMERGENCY SERVICE IMMEDIATELY.

Undesirable effects may be minimized by using the lowest effective dose for the shortest necessary time.

This product contains a non-steroidal anti-inflammatory drug: diclofenac.

You should not take along this medication other medicinal products containing non-steroidal anti-inflammatory drugs (including selective inhibitors of cyclooxygenase-2) and / or acetylsalicylic acid (aspirin).

Read the instructions carefully for other medications you are taking to ensure the absence of non-steroidal anti-inflammatory drugs and / or acetylsalicylic acid (aspirin).

This medicine is available in other dosages that may be more suitable.

Interactions with other drugs

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, even if it is a drug not prescribed, as there are some medicines that should not be taken together and others may require a change in dose when taken together.

You should always tell your doctor or pharmacist if you are using or receiving any of the following drugs before taking DICLOPAL 100 mg suppository:

–aspirin (acetylsalicylic acid) or other non-steroidal anti-inflammatory

–corticosteroids

–oral anticoagulants such as warfarin, injectable heparin, antiplatelets or other thrombolytics such as ticlopidine

–lithium

–methotrexate

–inhibitors of angiotensin converting enzyme inhibitors, diuretics, beta blockers and angiotensin II antagonists

–some antidepressants (selective inhibitors of serotonin reuptake)

–pemetrexed

–cyclosporine, tacrolimus

–deferasirox, beta-blockers.

Use during pregnancy and breastfeeding

Pregnancy

1) Up to 24 weeks of amenorrhea (5 elapsed months of pregnancy), your doctor may, if necessary, prescribe this drug in a timely manner.

2) From the 25th week of gestation (early 6th month of pregnancy), you should NEVER take this drug FOR YOURSELF because its effect on your child may have serious consequences, especially on a cardiopulmonary and renal plan, even with a single dose.

ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE TAKING ANY MEDICINE.

Breastfeeding

This medication passes into breast milk. As a precaution, you should avoid using it during breastfeeding.

ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE TAKING ANY MEDICINE.

Driving and using machines

In rare cases, this medication can cause dizziness, drowsiness, blurred vision.

3 HOW TO USE DICLOPAL 100 mg suppository?

Dosage, Mode and / or route (s) of administration, frequency of administration and Duration of treatment

Dosage

ADULT: The dosage depends on the indication.

Rheumatology:

–Attack treatment: 150 mg in 2 doses, or 1 suppository of 100 mg, to be completed with an oral form.

–Maintenance treatment: 1 suppository of 100 mg daily at bedtime.

IN ANY CASE, COMPLY STRICTLY TO ORDER YOUR DOCTOR.

Method and route of administration

Rectal route.

Duration of treatment

The use of the rectal route should be as short as possible because of the risk of local toxicity superimposed on the oral route risks.

Symptoms and instructions in case of overdose

If you used more DICLOPAL 100 mg suppository than you should:

In case of overdose or accidental poisoning, PREVENT A DOCTOR IMMEDIATELY.

Instructions in case of failure of one or more doses

If you forget to use DICLOPAL 100 mg suppository:

Do not take a double dose to make up the dose you missed.

4 WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?

Description of side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets everyone.

Medications such as DICLOPAL 100 mg suppository could increase the risk of heart attack (myocardial infarction) or stroke.

May occur:

•allergic reactions:

–skin: rash, hives, eczema,

–respiratory: asthma, lung disease,

–general, particularly in subjects allergic to aspirin,

–other: inflammation of small blood vessels, lower blood pressure.

•infrequently (especially during prolonged treatment and high dose [150 mg]), heart attack, heart failure (characterized by shortness of breath, difficulty breathing when lying, swelling of the legs or feet).

•rarely, peeling of the skin with bubbles that can quickly spread very serious to the whole body, a skin reaction when exposed to sunlight or UV, small purple spots under the skin (purpura), a cerebral vascular accident.

•rarely, gastrointestinal bleeding (discharge of blood from the mouth or stool, black stool color). It is even more common than the dosage used is high.

•rarely, jaundice.

In all these cases, immediately stop treatment and contact your doctor.

During treatment, it is possible that also occur:

•digestive disorders: nausea, vomiting, diarrhea, constipation, abdominal cramps, stomach pain, indigestion, loss of appetite, burping, inflammation of the stomach or intestine, inflammation or irritation of the anus or rectum (effects related to the route of administration), relapse of ulcerative colitis or Crohn's disease,

•headache, dizziness, lightheadedness, drowsiness, convulsions, insomnia, nervousness, fatigue, tremors, tingling, visual disturbances, tinnitus,

•hair loss,

•kidney function disorders, rare edema,

•of liver function disorders.

•an increase in voltage (hypertension).

In any case, tell your doctor.

•Cases of ulcer or gastrointestinal perforation, inflammation of the pancreas, severe hepatitis (liver inflammation), meningitis have been reported.

•Were also observed abnormal blood counts, liver and renal assessments, which can be serious.

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This also applies to any possible side effects not listed in this leaflet.

5 HOW TO STORE DICLOPAL 100 mg suppository?

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Expiration date

Do not use this medicine after the expiry date stated on the box. The expiry date refers to the last day of that month.

Storage conditions

Keep at temperatures below 25 ° C.

If necessary, warning against certain visible signs of deterioration

Do not throw any medicines to the sewer or in household garbage. Ask your pharmacist to dispose of medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6 FURTHER INFORMATION

Table C / List II

M.A. Holder: OPALIA PHARMA S.A. (RECORDATI GROUP), Zone industrielle Kalaat El Andalous 2022 Ariana Tunisie

Web site: www.opaliapharma.com.tn

M. A. N°: 902 343 1; DICLOPAL 100 mg, suppository, box of 10.

Date of the leaflet's aaproval: May 2017

opalia RECORDATI GROUP

AC0595/V6

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interupt by your self the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children

إن هذا دواء

- الدّواء مستحضر و لكنه ليس كغيره من المستحضرات.
- الدّواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال التي حددها لك.
- إقتني بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك.
- فالطبيب و الصيدلي هما الخبيران بالدّواء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع من تلقاء نفسك المداواة خلال المدة المحدّدة لذلك.
- لا تعد إلى المداوات ولا تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبدا في متناول أيدي الأطفال