

Fréquence d'administration

Appliquer après lavage et séchage minutieux, directement sur la lésion et sur la région péri-lésionnelle en massant doucement.

Durée du traitement

La durée du traitement est variable selon l'indication. En moyenne 2 à 3 semaines. Dans tous les cas, se conformer à la prescription de votre médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous avez oublié une application, n'augmentez pas la dose suivante, continuez normalement votre traitement.

4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SPORALIM 1 %, lotion est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Il est possible que surviennent des phénomènes d'irritation locale, d'allergie.

NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 COMMENT CONSERVER SPORALIM 1 %, lotion ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser SPORALIM 1 %, lotion après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Titulaire de l'A.M.M. : OPALIA PHARMA S.A. (Recordati Group)

Zone industrielle Kalaat El Andalous 2022, Ariana Tunisie

Site web : www.opaliapharma.com.tn

A.M.M. N° : 902 315 1 SPORALIM 1% lotion, flacon de 30 ml.

Date de révision la notice : Septembre 2017.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi prescrit par votre pharmacien.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

مدة العلاج مدة العلاج مختلف وفقاً للإستخدامات. بمعدل 2 إلى 3 أسابيع. في جميع الحالات لا يد من الممكن لوصفة طبيبك.

العلامات إذا كنت قد نسيت استعمال الدواء، لا تزد في الجرعة الموصى بها، وواصل علاجك بصفة عادية.

4 ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، سبوراليم 1٪ محلول للغسل من المungkin أن يسبب آثارا جانبية. على الرغم من أن الجميع لا يتعافى لها.

من الممكن روكود حكة وتهيج على تحسسي من العلبة.

إذا احتجت أي آثار جانبية غير تلك المذكورة في هذه النشرة، أو إذا كانت الآثار الجانبية خطيرة، يرجي اخبار طبيبك أو صيدليك.

5 كيف يحافظ سبوراليم 1٪ محلول للغسل؟

يحفظ هذا الدواء بعيداً عنتناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا تستعمل سبوراليم 1٪ محلول للغسل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة.

شروط التخزين

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

إذا لزم الأمر، تخزينات من بعض العلامات الواضحة للتدهور

لا ينبعى التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو التفاسيات المنزلية.

أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية. من شأن هذه التدابير أن تساعد في حماية البيئة.

6 معلومات إضافية

صاحب التأشيرة أوباليا فرما (مجموعة ريكورداتي) المنطقة الصناعية

قاعة الأشيلس 2022 أريانة تونس

موقع الويب www.opaliapharma.com.tn

تأشيري رقم : 902 315 1 سبوراليم 1٪ محلول للغسل، قنينة سعة 30 مل

تاريخ مراجعة النشرة : سبتمبر 2017

Duration of treatment

The duration of treatment varies according to the indication. On average 2 to 3 weeks. In all cases, comply with your doctor's prescription.

Instructions for omission of one or more doses

If you have forgotten an application, do not increase the next dose, continue your treatment normally.

4 WHAT ARE POSSIBLE SIDE EFFECTS?

Like all medicines, SPORALIM 1%, lotion is likely to have side effects, although not everyone is subject to it.

It is possible that local irritation, allergy.

DO NOT HESITATE TO REQUEST THE OPINION OF YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

If you notice any side effects not listed in this leaflet, or if any of the side effects gets serious, contact your doctor or pharmacist.

5 HOW TO STORE SPORALIM 1%, lotion?

Keep out of the reach and sight of children.

Expiration date

Do not use SPORALIM 1% lotion after the expiry date which is stated on the outer packaging.

Storage conditions

Store at a temperature not exceeding 25 °C.

If necessary, warnings against visible signs of deterioration

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist what to do with unused medications. These measures will help protect the environment.

6 Further INFORMATION

M.A. Holder: OPALIA PHARMA S.A. (Recordati Group)

Industrial Zone Kalaat El Andalous 2022, Ariana Tunisia

Website: www.opaliapharma.com.tn

M.A. N°: 902 315 1 SPORALIM 1% lotion, 30 ml bottle.

Revision date : September 2017.

AC0081/V8



إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكنه ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه للعلومات.
- اتبع دواعي وصوeca الطبيب وطريقة الاستعمال التي حددها لك.
- اقتصر بقدر ممكن على استهلاكه.
- فالطبيب والصيدلي هما الفيرون بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع من تناول نفسك المداواة خلال المدة المحددة لذلك.
- لا تتعذر إلى المداواة ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interrupt by yourself the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children