

Dermosone®

Bétaméthasone dipropionate

0,05%



1 QU'EST-CE QUE DERMOSONE 0,05 %, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Composition

• DERMOSONE 0,05 %, crème dermatique :

Substance active:

Bétaméthasone dipropionate 0,05 g

Excipients : Alcool cétoïstéarylrique, sorbitan monostearique, polysorbate 80, spermacte synthétique, octyl dodécanol, alcool benzénique, eau purifiée q.s.p. 100 g**Excipient à effet notable :** Alcool cétoïstéarylrique.

• DERMOSONE 0,05 %, lotion :

Substance active:

Bétaméthasone dipropionate 0,05 g

Excipients : Alcool isopropylique, carboxypolyméthylene, eau purifiée q.s.p. 100 ml

• DERMOSONE 0,05 %, Pommade dermatique:

Substance active:

Bétaméthasone dipropionate 0,05 g

Excipients : Huile de vaseline, vaseline blanche q.s.p. 100 g

Forme pharmaceutique

DERMOSONE 0,05 % crème dermatique : Tube de 15 g.

DERMOSONE 0,05 % lotion : Flacon de 15 ml.

DERMOSONE 0,05 % pommade : Tube de 15 g.

Classe pharmacothérapeutique - Code ATC

DEMOCORTICOÏDE (D, Dermatologie) - D07AC01

Indications thérapeutiques

- eczéma de contact, dermatite atopique, lichenification

- dermite de stase, psoriasis (à l'exclusion des plaques très étendues), lichen, prurigo non parasitaire, dyshidrose,

lichen scléro-atrophique génital, granulome annulaire, lupus

érythématoïque discoïde, dermite séborrhéique à l'exception du visage, traitement symptomatique du prurit du mycosis fongoïde - piqûres d'insectes et prurigo parasitaire après traitement étiologique (pour une durée brève)

La forme crème est destinée aux lésions aiguës, suintantes, la forme lotion est destinée aux lésions des plis et des zones pilaires et la forme pommade est destinée aux lésions sèches ou squameuses.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DERMOSONE 0,05 %?

Contre-indications

N'utilisez jamais DERMOSONE dans les cas suivants:

- allergie (hypersensibilité) à la substance active ou à l'un des autres composants de ce médicament.

- lésions ulcérées

- acne

- rosacée

- maladies infectieuses de la peau d'origine virale (herpès, zona, varicelle...), bactérienne (exemple: impétigo...), mycosique (dûs à des champignons microscopiques) ou parasitaire,

- application sur les paupières.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Faites attention avec DERMOSONE 0,05 %:

Précautions d'emploi

Ce médicament doit être utilisé en respectant les conseils du médecin:

- ne pas appliquer sur le visage sauf en cas de prescription formelle de votre médecin,

- éviter les applications sur une grande surface, sous un pansement occlusif en raison de la possibilité de passage d'une partie du principe actif dans le sang,

- éviter l'application prolongée, sur le visage, dans les plis, toute irritation ou infection doit être signalée à votre médecin, si une réaction d'intolérance apparaît, le traitement doit être arrêté,

La forme crème contient de l'alcool cétoïstéarylrique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma). EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Compte tenu de l'usage local de ce produit: aux doses recommandées, la bétaméthasone dipropionate pour usage topique n'est pas susceptible de causer des interactions médicamenteuses significatives d'un point de vue médical.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

En cas de grossesse ou d'allaitement, prévenir votre médecin. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3 COMMENT UTILISER DERMOSONE 0,05 % ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

0,05

درموزون®

بيتاميزون ديبروپونات

Dermosone®

Betamethasone dipropionate

0,05%

1 ما هو درموزون 0,05 % و في أي الحالات يتم استعماله؟

• درموزون 0,05 %, كريم جلدي:

بيتميمازون ديبروپونات 0,05

الأسوقة: حوكول ستيستيستيريل, صوربيتا مونوسيناري،

بويليسوريت 80: ناطف الموت الاصطناعية، أوكيكل مووكاتول،

حوكول البنزيل، ماء مصفى ل.ك.ل. 100 غ

سوانغ مع تأثير معرف: حوكول ستيستيستيريل.

• درموزون 0,05 % محلول للغسل:

بيتميمازون ديبروپونات 0,05

المادة الفعالة: الماده الصيدلاني

بيتميمازون ديبروپونات 0,05

الأسوقة: سائل البالغين، الفازلين الأبيض ماء مصفى ل.ك.ل. 100 غ

الشكل الصيدلاني

درموزون 0,05 %, كريم جلدي، أنيوب ذو سعة 15 غ.

درموزون 0,05 % محلول للغسل، قنفية ذات سعة 15 غ.

درموزون 0,05 %, مرهم جلدي، أنيوب ذو سعة 15 غ.

قشراني جلدي D07AC01

الاستطبابات العلاجية

- اكريباها الماء، التهاب الجلد التأتبي، تحرز

- التهاب الجلد الودكي، الصدفيه (استثناء لوات كبيرة جداً)،

الجزار، حوكال غير الطيفية، خلل التعرق، حرزا تصليبي-صموري

للاعاضة التاليفية، التهاب الجلد الدهني ما عدا الوجه والعلاج من أمراض

الحكمة بحسب الفحوصات

- لبع الحشرات وحوكال الطيفية بعد علاج المسببات (لفترة قصيرة)

الكريون الفنس مخصوص لعلاج الاصفات الماء المصحوبة بغيرات،

محلول الفنس مخصوص لآفات الطيارات والمناطق المشعرة،

المرهم مخصوص للآفات الجافة أو المصحوبة بغيرش.

2 ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استخدام درموزون 0,05 %

• مضادات الاستعمال

لا تستعمل أبداً درموزون في الحالات التالية:

- الحساسية (فرط الحساسية) للمادة الفعالة أو إلى أي من مكونات

هذا الدواء الآخر.

• آفات متفرحة

- جب الشباب

• عدم وردي

• الأمراض المعدية التي تصيب الجلد جراء فيروس (الهربس،

والقولبة، المخربة، حودي الماء...) أو الميكروبية (على سبيل

المثال، القهوة...) أو الفطريات (التي تسبيها الفطريات

الميكروسكوبية) أو طفيلي.

• انتظام العناصر على الأدوية الأخرى.

في حالة الشك لا تتردد في استشارة طبيبك أو صيدليك.

تقديرات خاصة واستعمال درموزون 0,05 %

كن حذراً عند استعمال درموزون

احتياطيات الاستعمال:

ينبغي استعمال هذه الدواء وفقاً لنصيحة الطبيب.

• لا يستعمل على الوجه إلا وضفة من الطبيب.

تجنب الاستعمال على مسامة واسعة تحت ضمادة مغلقة بحسب

إمكانية تمرير جزء من المادة الفعالة في الدم،

تجنب الاستعمال لفترات طويلة على المطبات، في الطيارات،

• يجب إبلاغ الطبيب من أي تهاب أو طبوسي.

في حالة حدوث تفاعلات عدم تحمل العلاج، يجب إيقاف العلاج.

يحتوي الدواء على مكونات قد تسبب ردود

فعل موضعية (عزم العلاج على المكان).

في حالة الشك لا تتردد في استشارة طبيبك أو صيدليك.

التفعّلات عن الأدوية الأخرى

نظراً للاستخدام المتكرر على المدى البعيد، ينصح بالانتباه

بمتباينات ديبروپونات ليس من الممكن أن تسبب تفاعلات

كبيرة مع الأدوية الأخرى من نفس الطبيعة.

إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخرًا أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية

التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية، يجب إبلاغ طبيبك أو صيدليك.

استخدام خلال فترة الحمل والرضاعة

عندما تكونين حاملاً أو مرضضاً أخرى طبيباً.

إسأل طبيبك أو صيدليك قبل تناول أي دواء.

3 كيف يستعمل درموزون 0,05 %

المقادير العلاجية، طريقة / أو سبيل الاستعمال.

تزيد الاستعمال، مدة العلاج

المقادير العلاجية :

استعمل دائماً الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب. في حالة

1 WHAT DERMOSONE 0,05 % IS AND WHAT IT IS USED FOR?

Composition

• Dermosone 0,05 %, dermic cream:

Active ingredient: Bетаметасон дипропионат 0,05 g

Excipients: Сетилстеарил алкохол, сорбита моностеарик, полисорбат 80, синтетич спермакет, октил додеканол, бензил алкохол, чисто воден s.q.f. 100 g

Excipient with known effect: Сетилстеарил алкохол.

• Dermosone 0,05 % lotion:

Active ingredient: Bетаметасон дипропионат 0,05 g

Excipients: Испирпилк алкохол, карбоксиполиметилен, чисто воден s.q.f. 100 ml

• Dermosone 0,05 %, dermic ointment:

Active ingredient: Bетаметасон дипропионат 0,05 g

Excipients: Вазелин oil, white vaseline s.q.f. 100 g

Pharmaceutical form

DERMOSONE 0,05 %, dermic cream: Tube of 15 g

DERMOSONE 0,05 %, lotion: Bottle of 15 ml.

DERMOSONE 0,05 %, dermic ointment: Tube of 15 g.

Pharmacotherapeutic class - ATC Code

Dermocorticoid (D, Dermatology) - D07AC01

Therapeutic indications

- Contact eczema, atopic dermatitis, lichenification

- Stasis dermatitis, psoriasis (excluding very large plates), lichen, non-parasitic prurigo, dyshidrosis, scleroderma, genital lichen, granuloma annulare, discoid lupus

erythematosus, seborrhoeic dermatitis except the face, symptomatic treatment of recurrent warts mycosis fungoidea.

- Insect bites and parasitic prurigo after etiological treatment (for a short time)

Cream form is intended for acute and oozing lesions, the lotion form is intended for lesions at folds and hairy areas and the ointment form is intended for dry or scaly lesions.

2 WHAT INFORMATION TO KNOW BEFORE USING DERMOSONE 0,05 %?

Contra-indications:

Never use DERMOSONE in the following cases:

• Allergy (hypersensitivity) to the active substance or any of the other ingredients in this medicine

• Ulcerated lesions

• Acne

• Rosacea

• Infectious skin diseases of viral origin (herpes, zona, varicella ...), bacterial origin (e.g. impetigo...), fungal origin (caused by microscopic fungi) or parasitic origin

• Application on the eyelids.

IN CASE OF DOUBT, IT IS ESSENTIAL TO ASK YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST FOR ADVICE.

Precautions for use; special warnings

This medicine must be used according to doctor's advice:

- do not apply on the face unless your doctor formal requirement,

- avoid applications over a large area, under an occlusive dressing because of the possibility of passing a portion of the active ingredient in the blood,

- avoid prolonged application, on the face, in the folds,

- any irritation or infection should be reported to your doctor, if an intolerance reaction occurs, treatment should be stopped.

The cream form contains cetostearyl alcohol that may cause local skin reactions (e.g. eczema).

IN CASE OF DOUBT DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST FOR ADVICE.

Interaction with other drugs

Considering the local use of this product : at recommended doses betamethasone topical is not likely to cause significant drug interactions from a medical point of view.

If you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription, tell your doctor or pharmacist.

Use during pregnancy and breastfeeding

In cases of pregnancy or breast-feeding, tell your doctor.

Ask your doctor or pharmacist before taking any medicine.

3 HOW TO USE DERMOSONE 0,05 %?

Dosage

Respect the recommended dose prescribed by your doctor. In case of doubt, consult your doctor or pharmacist.

The recommended dose is 1 to 2 applications per day in a thin layer, followed by a light massage.

Do not increase the number of applications per day.

Method and route of administration

Cutaneous route.

It's recommended to apply the product in spaced keys, then spread it by lightly massaging until fully absorbed.

Wash hands immediately after application unless you use this medicine to treat your hands.

Frequency of administration

1 to 2 applications per day as prescribed by your doctor.

La posologie est de 1 à 2 applications par jour en couche mince, suivies d'un léger massage.

Ne pas augmenter le nombre d'applications par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie cutanée

Il est conseillé d'appliquer le produit en touches espacées, puis de l'étaler en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.

Se laver les mains immédiatement après l'application sauf si vous utilisez ce médicament pour traiter vos mains.

Fréquence d'administration

1 à 2 applications par jour selon l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

L'arrêt du traitement se fera de façon progressive, en espaçant les applications et/ou en utilisant un corticoïde moins fort ou moins dosé.

Respecter strictement l'ordonnance de votre médecin et ne pas prolonger le traitement.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de DERMOSONE 0,05 %, que vous n'auriez dû:

Utilisez toujours DERMOSONE comme votre médecin vous l'a indiqué. Si vous avez accidentellement appliqué plus de DERMOSONE que prescrit par votre médecin, ne vous inquiétez pas mais évitez de le reproduire. L'utilisation excessive ou prolongée des corticoïdes locaux peut être à l'origine de manifestations d'hypertrophie cutanée, incluant la maladie de Cushing.

Traitements: un traitement symptomatique approprié est indiqué.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous avez oublié d'utiliser DERMOSONE 0,05 % :

N'appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée d'appliquer.

4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DERMOSONE 0,05%, est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit sujet.

En cas d'utilisation prolongée, il y a risque d'amincissement et de fragilité de la peau, dilatation de petits vaisseaux sanguins, vergetures, poussée d'acné.

Dès cas d'hypertrophie, de dépigmentation, et d'infection secondaire en particulier dans cas de traitement sous pansement occlusif ou dans les plis, ont été rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

5 COMMENT CONSERVER DERMOSONE 0,05 % ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser DERMOSONE 0,05 %, après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Tableau A / Liste I

Titulaire de l'A.R.M. OPALIA PHARMA (RECORDATI GROUP)

Zone Industrielle Kalâat El Andalous 2022 Ariana - TUNISIE

Site web : www.opaliapharma.com.tn

A.R.M. N° : 902 311 6 DERMOSONE 0,05% crème dermique, tube de 15 g.

A.R.M. N° : 902 311 6 DERMOSONE 0,05 % lotion, flacon de 15 ml.

A.R.M. N° : 902 311 2 DERMOSONE 0,05 % pommade dermique, tube de 15 g.

Date de révision de la notice : Septembre 2016

الشك، استنشق طبيبك أو الصيدلي.
الجرعة هي مرأة من مترين يومياً في طبقة رقيقة، يليه تدليك خفيف.

لا تزيد عدد الاستعمالات في اليوم الواحد.
طريقة / و سبيل الاستعمال:

سبيل جلدي.
من المستحبن الاستعمال في أماكن متباعدة، ثم التدليك بلطف حتى لا يختفي الماء.

غسل اليدين مباشرة بعد الاستعمال إلا إذا كنت تستخدم هذا الدواء لعلاج بيتك.

توازن الاستعمال:
مدة العلاج.

يتم وقف العلاج تدريجياً، والمبالغة بين الاستعمالات / أو استعمال أدوية مشتقة من الكورتيزون أقل قوة وأقل جرعة.

احترم وصفة طبيبك بدقة ولا تخل العلاج
الأعراض وتعليمات في حال الجرعة الزائدة:

إذا كنت استعملت درموزون 0,05 % أكثر مما يحب عليك أن:

تستعمل دائمًا درموزون كما أشار الطبيب، إذا قمت باستعمال درموزون أكثر من الجرعة المقدمة، لا داعي للقلق ولكن لا تدرك ذلك.

لا تستعمل الماء أو الغسول طويلاً كورتيزول الدواء، بما في ذلك داموكوتين.

العلاج عاجل مناسب للأعراض.

تعليمات في حال نسيان جرعة واحدة أو أكثر:

إذا كنت قد نسيت استعمال درموزون 0,05 %:
لا تستعمل ماءً طويلاً كورتيزول الدواء مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها.

4 ما هي التاثيرات الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، درموزون يمكن أن يكون له آثار جانبية، على الرغم من أن الجميع لا يتعرض لها.

في حالة الاستعمال لفترة طويلة، هناك خطر ترقق وهشاشة الجلد.

تمدد الأوعية الدموية المعقّرة، تقرّارات، عيوب الشاب.

تم الإللاع عن الحالات فرط الشعور، زوال الصياحة العصبية والثانوية.

على وجه الخصوص في حالة العلاج تحت ضمادة سادة أو إذا إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة، أو إذا كانت الآثار الجانبية خطيرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

5 كيف يحفظ درموزون 0,05 %

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرايا ومتناول الأطفال.

تاریخ انتهاء الصلاحية
لا تستعمل درموزون 0,05 % بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الجلبة.

ظروف الحفظ

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

إذا لزم الأمر، تخدير من بعض العلامات الواضحة للتدحرج

لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. أسلال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية الغير مستعملة. من شأن هذه التدابير أن تساعد في حماية البيئة.

6 معلومات إضافية

جدول أ قابلة ا
صاحب التأشيرة أوباليا فارما (مجموعة ريكوردياتي) المنطقة

الصناعية قاعة الأندلس 2022 - أريانا - تونس

موقع الويب : www.opaliapharma.com.tn

تأشيري رقم : 902 311 1 درموزون 0,05 %، كريم جلدي،

أنبوب ذو سعة 15 غ.

تأشيري رقم : 902 311 6 درموزون 0,05 %، محلول للغسل،

قنينة ذات سعة 15 مل.

تأشيري رقم : 902 311 2 درموزون 0,05 %، مرهم جلدي،

أنبوب ذو سعة 15 غ.

تاريخ مراجعة النشرة : سبتمبر 2016

Duration of treatment

Stopping treatment will be done gradually, by spacing applications and / or using a weaker or less dosed corticosteroid.

Comply strictly with the prescription of your doctor and do not extend the treatment.

Symptoms and instructions in case of overdose

If you use more DERMOSONE than you should:
Always use DERMOSONE as it has been prescribed by your doctor. If you have accidentally applied more DERMOSONE than prescribed by your doctor, do not worry, but do not reproduce. Excessive or prolonged local corticoids use may cause manifestations of hypercorticism, including Cushing's disease.

Treatment: appropriate symptomatic treatment is indicated.

Instructions in case of omission of one or more doses

If you forget to use DERMOSONE:

Do not use a double dose to make up for a forgotten dose.

4 WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?

As all medicines, DERMOSONE can have side effects, although not everybody gets them.

If prolonged use, there is a risk of thinning and fragility of the skin, dilation of small blood vessels, stretch marks, acne breakout.

Cases of hypertrichosis, depigmentation and secondary infection, particularly in case of treatment under an occlusive dressing or in the folds, have been reported.

If you notice any side effects not listed in this leaflet, or if the side effects get serious, tell your doctor or pharmacist.

DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST FOR ADVICE

5 HOW TO STORE DERMOSONE 0.05 %?

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Expiration date

Do not use DERMOSONE 0.05% after the expiry date stated on the packaging.

Storage conditions

Do not store above 25 °C.

If necessary, warning against some visible signs of deterioration Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of unused medicines. These measures will help protect the environment.

6 FURTHER INFORMATION

Table A / List I

M. A. Holder OPALIA PHARMA (RECORDATI GROUP) Industrial Zone Kalaat El Andalous - 2022 Ariana-Tunisia

Website : www.opaliapharma.com.tn

M.A. N°: 902 311 1 DERMOSONE 0.05% dermic cream, tube of 15 g.

M.A. N°: 902 311 6 DERMOSONE 0.05 % lotion, bottle of 15 ml.

M.A. N°: 902 311 2 DERMOSONE 0.05 % dermic ointment, tube of 15 g.

Date of the leaflet's revision: September 2016

AC 0060/V8



CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

إن هذَا دوَاء

- الدوَاء مستحضر ولكنه ليس كغيره من المستحضرات.
- الدوَاء مستحضر يؤخذ على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرّضك للخطر.
- إنّي أبغض بقعة وصفة الطبيب وطريق الاستعمال التي حددها لك.
- أبغض بقلاعٍ يحصل عليه الصيدليّها المُغْرِيّ بها.
- لا تقتصر على تناول نفس الدواء خالٍ المدة المحددة لك.
- لا تدع إلى المداواة ولا تزد على مقدار استهلاكه طبيباً.

لا تترك الدوّة أبداً في متناول أيدي الاطفال

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interrupt by yourself the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children